訂補明醫指掌卷之五

脾胃症一

【歌】脾胃相通五穀消。輸精脈絡裕三焦。當其健運施生化。能食而肥氣血饒。四時胃氣爲根本。脈實弦洪與石毛。一有所傷營運遠。從茲便覺此身嬌。勞形過食中州損。怠惰貪眠面色焦。水不運行生痞張。食難尅化肉潛消。脾胃旣病如何療。要適寒溫飲食調。

【論】夫脾爲倉廩之官。胃爲水穀之海。然胃主司納。脾主消導。一表一裏。一納一消。運行不息。生化氣血。

滋榮脉絡。四肢百骸。五臟六腑。皆藉此以生養。故四時皆以胃氣爲本。如易之坤厚載物。德合無疆。故萬物資生於坤元也。脾胃論云。人之脾胃盛。則多食而不傷。過時而不饑。脾胃衰。則多食而傷。少食而瘦。過時而饑。此脾胃盛衰可見也。不善攝生者飲食不節。寒暑不調。喜怒失常。勞役無度。未有不損其脾胃者也。經云。飲食勞倦則傷脾胃。脾土旣傷。不能輸運。則氣血精神。由此而日虧。臟腑脉絡。由此而日損。肌肉形體。因此而日削。故有怠惰嗜卧。四肢無力。面色痿黃。食㑊消癉。瘇滿泄痢之

病生焉。經云三損損於肌肉。肌肉消瘦。飲食不能為肌膚。故損其脾者。調其飲食。適其寒溫。此謂理脾胃之良法也

脾胃不和

脾不和。則食不化。胃不和。則不思食。脾胃不和。則不思而且不化。或吐。或瀉。或脹滿。或吞酸。或噯氣。或惡心。用治中湯。脾不和。不喜食而食不消者。枳縮二陳湯。枳朮丸。胃不和者。平胃散。

治中湯　治脾胃不和。嘔逆霍亂。中滿虛痞。或泄瀉。

人參一錢　甘草炙一錢　乾薑炮一錢　白朮土炒一錢

青皮一錢 陳皮一錢

右剉作二服。水一盞。煎一盞。空心服。

枳縮二陳湯 即二陳加砂仁枳殼。方見痰症條

枳朮丸 治痞消食强胃。

枳實麩炒一兩 白朮二兩

加橘皮。名橘皮枳朮丸。

加麴蘖。名麴蘖枳朮丸。 加木香。名木香枳朮丸。

加半夏。名半夏枳朮丸。 加芩連。名芩連枳朮丸

右為末。荷葉煮飯為丸如桐子大。空心白湯送下五六十丸。

脾胃虛損

脾胃虛損者補中益氣湯四君子湯脾胃虛飲
不進。嘔吐瀉利。四肢無力。怠惰嗜臥。或病後脾胃
受傷。元氣不足。參苓白朮散。建中湯。

補中益氣湯 方見內傷

四君子湯 補脾胃大虛。飲食不思。嘔吐洩瀉等症。

人參去蘆一錢 白茯苓一錢 白朮土炒二錢 甘艸蜜炒一錢

右剉一劑。生薑三片。大棗二枚。水二鍾。煎八分服。

○如吐瀉。加藿香白扁豆。○咳嗽。加桑白皮五味子。○心煩不定。加辰砂酸棗仁遠志。○心熱。加麥門冬茯神蓮肉。○驚風陰症。加全蝎。白附子。○口

渴加乾葛烏梅○胃冷加丁香砂仁木香○腹脹不思飲食加白豆蔻砂仁○喘急胸膈不寬加枳殼○盜汗加黃芪小麥○小便澀加猪苓澤瀉木通○水瀉不止加木香訶子豆蔻

參苓白朮散　調理脾胃受傷元氣不足諸虛等症

白朮二兩土炒　人參二兩去蘆　甘艸二兩炙　乾山藥二兩炒
白茯苓二兩　白扁豆一兩五錢薑汁炒去皮　蓮肉一兩去皮
薏苡仁一兩　砂仁一兩炒　桔梗一兩炒

右為末每服二錢棗湯調下

建中湯　治虛惡寒

脾胃停食

脾胃停食。不能消導。麯蘖橘半枳朮丸。或枳桔二陳湯加山查神麴。或保和丸。脾胃不和。伏痰留飲者。二陳湯加澤瀉猪苓厚朴蒼朮。或利膈化痰丸。

枳桔二陳湯 即二陳加枳殼桔梗 方見痰症

保和丸 方見傷食

二陳湯 見痰症

利膈化痰丸 方見痰症

脾胃虛寒

脾胃有寒。脉遲。理中湯。脾胃虛冷。心腹脹滿疼痛

厚朴溫中湯。胃寒不進食。香砂養胃湯。進食散。

理中湯 方見中寒

厚朴溫中湯

厚朴 薑炒八分 乾薑 七分 甘艸 炒六分 木香 五分

陳皮 八分 茯苓 八分

右剉一劑。生薑三片。大棗二枚。水二鍾。煎八分服。

人參開胃湯

人參 去蘆一錢 白朮 土炒一錢 白茯苓 一錢 甘艸 炙八分

陳皮 八分 半夏 薑製七分 神麴 炒七分 麥芽 炒七分

砂仁 炒七分 厚朴 薑汁拌勻炒燥七分 丁香 五分

藿香葉分 蓮肉去皮 生薑

右剉一劑。水二盞煎八分。空心服。

香砂養胃湯 方見瘧疾

脾胃伏火

脾胃鬱火。二陳加芩連山梔。脾胃虛熱津不足。白朮散。脾胃有熱。消穀善饑。三黃枳朮丸。脾熱口臭瀉黃散。胃火齒痛。淸胃散。

白朮散 即四君子湯加木香藿香乾葛。方見前

三黃枳朮丸 即枳朮丸合三黃丸。枳朮丸方見前 三黃方見火症

瀉黃散 見火症

清胃散 見火症

脾胃中溼

脾胃中溼者。平胃散。脾胃中溼瀉痢者。胃苓湯。脾胃寒溼脾泄者。椒朮養脾丸。脾溼身腫便澀。五苓散。虛者實脾散。實者十棗湯。

平胃散 方見中溼

五苓散 方見中溼

胃苓湯 方見中溼

椒朮養脾丸 治脾胃虛冷。心腹脹悶。嘔逆泄瀉。

麥芽炒四兩 白茯苓四兩 人參去蘆二兩 蒼朮泔浸晒乾炒二兩

白朮二兩 乾薑一錢 砂仁 川朴二錢

甘艸炙四錢

右爲末。煉蜜丸。每兩作八丸。每服一丸。細嚼薑湯下。

實脾散　治陰水發腫。用此先實脾土。

白朮土炒一錢　白茯苓一錢　木香八分　厚朴薑汁拌勻炒燥八分

木瓜一錢　乾薑炮八分　艸果八分　大腹子一錢

甘艸炙七分

右剉一劑。薑三片。棗二枚。水二盞。煎八分。空心服。

十棗湯　治懸飲內痛。

芫花熬　甘遂　大戟等分

右爲末。以水一升半。煮大棗十枚。煎至八合。去查納藥末。強壯者一錢。虛弱人五分。平旦服之。不下。再加五分。下後以糜粥調之。○按本方。乃泄水散飲之聖藥。然有毒不可輕用

傷食症二

【歌】胸膨噯氣爲傷食。氣口緊盛端可識。所傷仍辨熱和寒。元氣要分虛與實。

【論】經云。飲食自倍。腸胃乃傷。故傷食者。氣口脉緊盛左手脉平和。胸膈痞塞。噫氣如敗卵臭。頭疼。發熱

絕類傷寒，但身不疼爲異耳。所傷之物，有辛辣香燥炙煿酒麪熱物者，有傷生冷魚腥水果寒凉等物者，有壯實人縱飲大嚼者，有虛弱人多食不尅化者之不同。更審其所傷多少，酌其元氣虛實，而消之、導之、攻之、補之，則萬舉萬全，而無誅伐太過之失也。

〔脉〕氣口緊盛，爲傷于食。食不消化，浮滑而疾。

傷冷物

所傷一切冷物，如魚腥瓜果之類，胸中痞滿者，二陳湯加香附、砂仁、神麴、紅豆，或治中湯，或木香見

晛丸。仍用炒麩皮熨之

二陳湯方見痰症

治中湯方見脾胃

木香見晛丸

巴豆霜五分　京三稜一兩　神麴炒黃一兩　木香二錢

香附五錢炒熟　石三稜五錢去皮與京三稜共煨　升麻三錢

柴胡三錢　艸豆蔻麩裹燒熟取仁五錢

右爲細末。湯浸飥餅爲丸如菉豆大。每服二十丸。白湯下。量所傷多少服之

傷熱物

所傷熱物如薑椒蒜韮酒麪炙煿煎炒犬肉辛辣之類致心下痞滿作痛者。三黃枳實湯。或二陳加芩連山查枳實神麴麥芽。食巳下。大便不通。大承氣湯下之。

三黃枳實湯

黃芩一錢 黃連一錢 大黃煨一錢 枳實二錢

厚朴五分 甘艸五分

右剉一劑。水二盞。煎八分。空心熱服。

二陳湯見痰症

大承氣湯

大黃三錢 芒硝三錢 厚朴一錢五分 枳實一錢五分

右剉一劑。水二大鍾。煎至八分。熱服。以利為度

按經曰。脾胃者。倉廩之官。無物不受。一有停滯。則氣不順而生痞滿燥實堅。是方也。厚朴苦溫以去痞。枳實苦寒以瀉濁。芒硝鹹寒以潤燥軟堅。大黃苦寒以瀉實去熱。此土鬱則奪之之意也。

虛人傷食

虛弱人食不化。痞滿者。六君子湯加神麯麥蘖山查。大便不通者。加枳實厚朴。或枳朮丸加麯蘖橘半山查。虛甚者加茯苓人參。

六君子湯 即四君子湯合二陳湯 四君子見脾胃 二陳見痰症

枳朮丸 方見脾胃

實人傷食

氣壯人傷食。痞滿不消者。保和丸。大便閉結不通脹滿者。木香檳榔丸。

保和丸 治食積

山查肉 二兩 蒸熟 神麴 炒一兩 半夏 一兩

茯苓 一兩 萊菔子 五錢 陳皮 五錢 連翹 五錢

右爲末。神麴糊丸如桐子大。每服三錢。空心米湯下。加白朮名大安丸。

木香檳榔丸 治一切氣滯。心腹痞滿。脇肋脹痛。大小便結滯不利者。

木香一兩 檳榔一兩 蓬朮一兩 青皮一兩

陳皮一兩 枳殼一兩 黃連一兩 香附三兩

大黃炒二兩 牽牛生取頭末三兩

右爲末。水發爲丸。食後薑湯送下四五十丸以利爲度

霍亂症三

歌 霍亂須分溼與乾。吐空瀉盡始能安。若還關格陰陽逆。生死分明反掌間。甚則轉筋仍厥逆。理中薑

附可驅寒，熱多而渴五苓散，暑症香薷藿朴堪。

論 夫霍亂者，揮霍撩亂也。外有所感，內有所傷，陰陽乖隔，上吐下利，躁擾悶亂是也。偏陽則多熱，偏陰則多寒。卒然而成，危急甚，獨得吐利者，名曰溼霍亂，爲可治。蓋所傷之物盡出故也。若上不得吐，下不得利，所傷之物不得出，壅閟正氣，關格陰陽，其死甚速。須用鹽湯探吐，得出則寬。輕者手足溫和，甚者臍腹絞痛，厥逆脉脫，舉體轉筋，當溫補回陽復脉。若暑月多食瓜果泉水，以致食鬱于中而成霍亂者，宜辛溫散其標寒，次以寒涼清其暑熱，可

也渴甚者氷水解之。

脉 霍亂吐瀉。滑而不匀。或微而濇。或伏驚人。熱多洪滑。弦滑食論。

濕霍亂 即吐瀉

霍亂吐利藿香正氣散。腹痛厥冷脉沉理中湯。轉筋不已。木瓜散。膝腕內紅筋。刺出紫血。炒鹽熨臍

藿香正氣散 治四時不正之氣。不服水土。脾胃不和。吐利腹痛。飲食停滯。惡心胸滿者主之。

藿香二錢 白芷一錢 桔梗一錢 半夏一錢薑製

紫蘇一錢 陳皮一錢 白朮一錢炒 大腹皮一錢

茯苓一錢　厚朴薑炒一錢　甘艸炙一錢

右剉一劑，加薑三片，棗一枚，水煎溫服。○轉筋加木瓜。○腹痛加炒芍藥。寒痛加桂。○食不化加香附砂仁神麴麥芽。○中暑加香薷扁豆。○痔氣憎寒惡熱加柴胡乾葛。○小便不利合五苓散。○若頻欲登圊不通者加枳殼。

理中湯 方見中寒

木瓜散

木瓜二錢　茴香三分半　甘艸二分炙　吳茱萸一錢半

紫蘇十葉　生薑五片

右剉一劑。水二盞。煎八分。空心溫服。

乾霍亂 俗名絞腸沙

不得吐利。臍腹痛甚。躁擾悶痛欲絕。以鹽湯灌下一椀許探吐。若不得吐不治。更以吳茱三四兩。用鹽數兩炒熱熨臍下。

暑霍亂

暑月霍亂。六和湯。熱而燥渴煩悶。五苓散。或以涼水調益元散。或桂苓甘露飲。或藿薷湯冷服。

六和湯 治冒暑伏熱煩悶。氣不升降。霍亂轉筋。嘔吐泄瀉。寒熱交作。痰喘咳嗽。胸膈痞滿。頭目昏痛。

六和湯　治冒暑伏熱煩悶氣不升降霍亂轉筋嘔
服體浮腫小便赤澀怠惰嗜臥及中酒煩渴畏食
竝用此湯隨症加減。

縮砂一兩　半夏一兩　杏仁一兩　白扁豆二兩
人參一兩　甘草炙一兩　赤茯苓二兩　藿香葉二兩
木瓜二兩　香薷四兩　厚朴薑炒四兩

右剉每服一兩薑棗水煎○按六和者和六府也。脾胃者六府之總司故凡六府不和之病先于脾胃而調之是方有藿香砂仁香能開胃竅也半夏生薑辛能散逆氣也茯苓木瓜淡能利溼竅也參朮扁豆甘能調脾胃也脾胃一治則水精四布五

經竝行。雖四肢百骸九竅皆。太和矣。況于六府乎。

五苓散 方見中溼

益元散 又名六一散

滑石六兩水飛 甘草一兩

右爲細末。水調服。

桂苓甘露飲 治夏月引飲過多。肚腹膨脹。霍亂洩利。小便赤澀。口乾燥渴。

白朮二兩炒 白茯苓二兩 豬苓二兩 澤瀉二兩去毛

滑石二兩研 寒水石二兩研 甘草一兩炙

肉桂五錢去皮

右剉每服一兩五錢水二鍾煎八分溫服○按本方以五苓利三焦之溼二石清六府之熱此河間治溼熱之簡便者張子和加人參因其脉虛故也

嘔吐症四

〔歌〕得食即吐知為火停久而來都是寒久病胃虛因不納或緣氣逆與停痰食塡胃口多生嘔新穀如何得下關欲辨熱寒虛實候大微遲數脉中參

〔論〕有聲有物曰嘔有物無聲曰吐有聲無物曰乾嘔皆主於脾胃有胃寒者有胃熱者有胃虛者有痰膈者有氣滞者有食欝熱之不同在乎參之以脉

驗之以症則虛實冷熱之形無所逃矣。

脉 嘔吐無他寸緊滑數微數血虛單浮胃薄芤則有瘀最忌濇數。

胃熱

得食即嘔胃火也脉必數而口渴二陳加薑炒芩連火上冲食已暴吐和中桔梗湯荆黃散調檳榔末。

和中桔梗湯 治氣熱上冲食已暴吐脉洪數

茯苓二錢 半夏七分包 陳皮八分 白朮炒八分

生薑五片 枳實炒八分 厚朴薑炒八分 桔梗八分

荆黃散　治上焦氣熱所冲暴吐

荆芥二錢　人參一錢　甘草五分　大黃六分

右剉一劑。水煎。調檳榔末一錢。磨木香五、六分。溫服。

胃寒

食積爲寒所逆。停久而吐者。脉必遲。理中湯加半夏木香薑汁。或紫沉丸。胃寒嘔吐清水者。二陳湯加丁香砂仁。

理中湯　方見中寒

紫沉丸

沉香三錢 檳榔三錢 紫蘇梗五錢 益智去殼炒一兩

神麹五錢 麥芽五錢 白朮五錢 烏藥五錢

香附炒五錢 陳皮一兩 厚朴薑炒一兩 甘艸炙三錢

右爲末。水丸。砂仁湯送下三錢。

胃虛

胃虛不能納食而吐者。脉必微。六君子湯。加丁香砂仁。飲食傷脾胃而吐者。枳朮丸。枳朮二陳湯加香附砂仁。飲酒傷胃。嘔吐不止者。葛花解醒湯。

六君子湯 方見傷食

枳朮丸 方見脾胃

枳朮二陳湯　即二陳加枳實白朮

葛花解醒湯　方見內傷

食鬱

停積食不剋化新穀不下而反出。脈沉。瓜蒂散。或保和丸。食鬱飲食不消塡塞胃口而嘔吐者。二陳湯加神麯山查薑炒黃連厚朴枳實。

瓜蒂散　方見痰症

保和丸　方見傷食

痰氣

因痰氣壅滯。胃口。食不下而作嘔者。二陳湯加竹

瀝薑汁枳實瓜蔞。脉沉。瓜蔕散。痰在胸中嘔噦。溫膽湯。氣逆枳桔二陳湯。

二陳湯　方見痰症

枳桔二陳湯　即二陳加枳殼桔梗。

溫膽湯　即二陳加竹茹枳殼。

翻胃症五

〔歌〕翻胃多因氣血虛。脉來不足命多殂。是痰是火宜消降。數滑而沉可驗之。更有寒鬱併氣滯。脉來沉伏與沉遲。

〔論〕翻胃成於噎膈。噎而至於翻胃。則已危矣。或朝食

而暮吐或暮食而朝吐其吐必盡所食日日如此不變易者。是也。至於吐無時者。嘔吐也。空噦而無所出者。虛嘔也。大抵此病。由血槁不能榮潤腸胃。故上不得納。下不得便。如腸結若羊糞者死。然血虛者。則脉數而無力。氣虛者。則脉緩而無力。氣血兩虛者。口中多出沫。但沫大出者必死。亦有熱甚者。則脉數而有力。有痰阻者。則脉滑而有力。因氣滯者。其脉沉而伏。因寒鬱者。其脉沉而遲。皆非血氣衰竭。故可治。學者須審其虛實而斷之。斯無失也。

〔脉〕翻胃噎膈。寸緊尺濇。緊芤或弦。虛寒之厄。關沉有痰。浮濇胃積。浮弱氣虛。濇小血弱。若濇而沉。七情所搏。

[illegible]

虛而[illegible]血[illegible]潤大腸。故便難。蓋幽門不通。上衝吸門。食下能納。年老者難治。年少者猶可保全。四物湯加桃仁紅花麻仁枳殼。結甚者暫加熟大黃以導其滯。量人虛實用之。中年人四物湯加童便韮汁牛羊乳竹瀝薑汁。氣虛者。參苓白朮散。氣虛有火兼痰者。七聖湯。陰虛火上衝者。四物湯加知母

黃蘗薑汁竹瀝。若飲食少思大便不實胸膈痞悶呑酸噯腐食不化而反出。是爲脾胃虛寒。即王太僕所謂食入反出。是無火也。用六君子湯加炮乾薑白豆蔻黃連製。吳茱萸。如不應。用八味丸補命門火以生脾土。

四物湯 方見血症

參苓白朮散 治脾胃虛弱。飲食不進。嘔吐泄瀉

人參二錢去蘆 茯苓二錢去皮 白朮二錢土炒 乾山藥二錢炒

甘草二錢炙 白扁豆去皮薑汁浸炒一錢五分 蓮肉炒一錢

砂仁炒一錢 桔梗炒一錢 薏苡仁一錢

右爲細末。每服二錢。棗子煎湯調下。

七聖湯　治翻胃嘔吐

半夏一錢　黃連一錢　白豆蔻一錢　人參一錢

白茯苓一錢　竹茹一錢　生薑三片

右剉一劑。水二鍾。煎八分。空心熱服。

六君子湯　方見脾胃

八味丸　即六味丸加肉桂附子　方見虛損

實

胃中有火。不能停食者。即王太僕所謂食不得入是有火也。二陳湯加竹瀝薑汁。炒黃連山梔。便涪

枳殼瓜蔞仁竹瀝薑汁。或用化痰丸。氣逆者。脉浮而洪。食已暴吐。氣上衝胸發痛。用木香調氣散。氣滯者。脉沉而伏。二陳湯加木香砂仁青皮枳殼。食與氣相假成積。若其脉浮而匿。其症或先痛而後吐。或先吐而後痛。治法當以小毒藥去其積。檳榔木香行其氣下。焦有寒者。其脉沉而遲。其症朝食暮吐。暮食朝吐。小便清。大便閉而不通。治法當以通其閉塞。溫其寒氣。大便漸通。復以中焦藥和之不令大便秘結而自愈也。

二陳湯 方見痰症

化痰丸 方見痰症

木香調氣散

白豆蔻二兩 丁香二兩 木香二兩 檀香二兩

藿香葉八兩 炙甘草八兩 砂仁四兩

右爲末。每服二錢。入鹽少許。沸湯點服。

一方 治翻胃之要藥

韮汁二兩 牛乳一盞 生薑半兩取汁 竹瀝半盞

童便一盞

右五味和勻頓服或入煎劑中同服尤佳。

一方治翻胃極効。用螃蠏洗淨。入水中。蠏背上水要高二三四指。以香油一小盞入水中。將兩指捻白麪撒水上。蠏臍內白沫即出。次日去蠏。留水曬乾為末。每服五分。淡燒酒下。

噎膈症六

【歌】噎膈生於血液乾。或因氣火或因痰。近於咽嗌名為噎。水飲能吞食物艱。胃脘之間成膈症。食雖能進下關難。要察脉症求虛實。勿泥辛香槩作寒。

【論】丹溪云。噎病生於血乾。蓋胃為水穀之海。脾為消化之器。清和則健運。能為諸經行其津液。稍有不

行。則胃滯壅塞。而噎膈之病作矣。世人皆遵局方。但有嘔吐者。便用香燥熱藥。偏助其火。不思此病。原因燥結枯槁而成。復用香燥熱藥治之。其謬甚矣。其始胃液凝聚。其久也脾氣耗敗。傳之漸遲。烏附丹毒。服之積久。血液俱耗。胃脘乾槁。其槁在上。近咽之下。水飲可行。食物難入。間或可入。入亦不多。名之曰噎。其槁在下。與胃為近。食雖可入。難盡入胃。良久復出。名之曰膈。漸成反胃。小便秘。大便如羊糞。名雖不同。病出一體。夫血。陰也。陰主靜。內外兩靜。則臟腑之火不起。金水二氣有養。陰血自

生腸胃津潤傳化合宜何噎之有世人專用香燥
熱藥者。不知此理也。予和引內經三陽結爲膈立
論。力辨世人熱藥之悞可謂明矣。又有以承氣治
之。失之太峻也。蓋噎有因火氣冲逆。食不得入者。
脉數大。有因痰飲阻滯者。脉結滑。有七情鬱結者。
脉沉濇。有因瘀血積滯。蓋陽無陰不能施化陰失
位。陽伏其中。傳化不變而反上行。其脉芤濇。因氣
者從氣治。因血者從血治。因痰者導之。因火者壯
水制之。豈專以辛香燥劑乎。若脾胃陽火衰微。不
能運化者。暫以辛溫藥。開其結滯。仍以益陰養胃

爲主。若槩以局方辛香燥熱之藥。以火濟火。重耗其津液。則大便閉結。幽門不通。上冲吸門。而噎膈轉甚矣。此千古之弊也。

達按前症。多起于憂鬱。憂鬱則氣結于胸臆而生痰。久則痰結成塊。膠于上焦。道路窄狹。不能寬暢飲或可下。食則難入。而病已成矣。好酒之徒。患此者。必是頑痰蓋酒能發火。火能生痰。痰因火煎膠結不開。阻塞道路。水飲下咽。亦覺痛澀。若以血槁治。投當歸地黃等藥。血未必潤。反助其痰。病何由愈。若黑瘦之人。眞陰素虛。常覺內熱。又不嗜酒。或

過服香燥熱藥者。當以血藥治

痰氣

喜怒七情。傷于脾胃。鬱而生痰。痰與氣搏。升而不降。飲食不下。氣留于咽嗌者。快氣餅子。四七湯主之。痰鬱者。化痰丸。關格者。必用吐以提其氣。若橫格。不必在乎出痰也。有痰亦宜吐。導痰湯。其關格者。詳本條內。

快氣餅子　治氣鬱不快。食下則胸膈噎塞疼痛。

萊菔子二兩炒　紫蘇子一兩　橘紅一兩

白豆蔻一兩　白茯苓一兩

右爲細末。煉蜜和薑汁爲餅子。時時噙嚼之。

四七湯 治七情氣鬱。結聚痰涎。狀如破絮。或如梅核在咽喉之間。咯不出。嚥不下。并治中脘痞滿。痰涎壅盛。上氣喘急。婦人有孕惡阻。亦宜服之。

半夏一錢半 白茯苓一錢 蘇葉一錢

厚朴一錢三分

右剉一劑。生薑七片。大棗一枚。水二鍾煎八分服。

化痰丸 方見痰症

滌痰湯

甘草一兩 桔梗一兩 瓜蒂五錢 枳殼五錢

陳皮 五錢

右用水十椀煎至五椀去查。逆連飲盡。浸浮其痰。發一惡心。即大吐。得寬後。可服參苓白朮散調理不致復發矣。

火

上焦火盛冲逆。食不得下而嘔者。和中桔梗湯加竹茹枇杷葉。渴者去半夏。加麥冬。大便燥結者。人參利膈丸微下。血少陰虛。火盛不得眠。食入反出者。朱砂安神丸。

和中桔梗湯 方見嘔

人參利膈丸　治胸中不利。痰咳喘滿。和脾開滯推陳致新。治噎膈之聖藥。

木香一兩　檳榔一兩　人參一兩　當歸一兩

藿香一兩　甘草一兩　枳實一兩　大黃酒浸一兩

厚朴薑製一兩

右爲細末。水丸。溫水送下五十丸。如桐子大。仍用猪膽導之。得通便住。

朱砂安神丸　方見驚悸

虛

血氣槁弱。而成壅塞者。養血湯。或潤血飲子。脾虛

中氣不足八珍湯加橘皮竹茹枇杷葉

養血湯

當歸二錢 生地黃二錢 玄參二錢 阿膠二錢

知母二錢 紅花五分酒洗 桃仁五分研泥

右剉一劑。水二盞煎八分。加生白蜜二匙服。

潤血飲子 增 治血槁成噎

水一鍾。入阿膠一兩。化開。煎至七分加竹瀝半盞。

人乳一盞。蜜五匙。徐徐服之。

瘀血

瘀血則脉澀桃仁承氣湯下之。

桃仁承氣湯方見本條下

痞滿症七

〔歌〕胸中滿悶名爲痞，外面殊無脹急形。食積結痰兼溼熱，氣虛不運病根深。

〔論〕痞者否也，不通之意。由陰伏陽畜，氣血不運而成。處心下，位中央，瞋滿痞塞，皆土之爲病也。然痞與脹有輕重之分。痞則內覺痞悶，而外無脹急之形也。有中氣不足，不能運化者；有飲食痰結，不能施化者；有溼熱太甚而成者。當隨症分消，虛者補中益氣湯，不可峻劑攻之；實者略與疎導。昧者茍圖

〔脈〕痞滿滑大，痰火作孽；弦伏中虛，微澀衰劣。

暫時通快，喜行峻利，多致危殆也。

〔脈〕痞滿滑大，痰火作孽。弦伏中虛，微濇衰劣。

中氣不足

中氣不足，不能運化精微而爲痞悶，脈弱無力，不可用利藥攻之。補中益氣湯，久服中氣充滿，清道健運，痞自除也。

補中益氣湯 方見內傷

食積

飲食內傷，不能尅化而痞者，枳朮丸，或保和丸，或枳桔二陳湯加神麴、麥芽、山查。心下虛痞，按之痛

者。枳實消痞丸、黃連瀉心湯

枳朮丸 方見脾胃

保和丸 方見傷食

枳桔二陳湯 方見脾胃

枳實消痞丸

枳實 炒一錢　山查肉 一錢　黃連 炒二錢　神麴 炒一錢

甘艸 炙一錢　猪苓 一錢　澤瀉 八分　厚朴 薑汁拌炒八分

砂仁 炒八分　陳皮 一錢　人參 去蘆一錢　黃芩 炒一錢

乾薑 八分　薑黃 五分　白朮 炒一錢

右末，蒸餅丸梧子大，每服五十丸，食後白湯送下。

黃連瀉心湯

黃連一錢二分　厚朴製一錢　乾薑八分　甘艸五分

人參八分　白芍藥八分

右剉一劑。薑三片。水二鍾。煎八分。空心熱服。

溼熱

溼熱太甚而痞者。黃連瀉心湯。有熱。三黃瀉心湯。

火邪乘脾而痞者。二陳加黃連黃芩瓜蔞。

黃連瀉心湯方見前

三黃瀉心湯

大黃三錢　黃連三錢　黃芩三錢

右剉一劑。水二盞。煎一盞。熱服。

二陳湯 方見痰症

痰滯

痰氣阻滯中州而爲痞者。小陷胸湯。或枳桔二陳湯加黃連瓜蔞天花粉。痰氣壅滿。心胸痞滿不寬。導痰湯。

小陷胸湯

半夏 六錢 黃連 三錢 瓜蔞 小者一箇 大者半箇

用水二鍾。加生薑三片。先煎瓜蔞。約鍾半許。入半夏黃連煎至一鍾溫服。

枳桔二陳湯。方見痰症

導痰湯方見痰症

惡心症八

〔歌〕畏食分明是惡心。嘔而無物亦無聲。胃中寒氣兼痰火。隨症斟量細辨明。

〔論〕戴云。惡心者。無聲無物。心下欲吐不吐。欲嘔不嘔心中兀兀如畏舟車者是也。

胃寒

胃中有寒氣而作惡心者。嘔清水。不渴。脉遲。明知食寒物。受寒氣。大半夏湯。小半夏茯苓湯理中湯。

加生薑半夏。

大半夏湯

半夏二錢五分 陳皮二錢五分 茯苓二錢五分 生薑二錢五分

右剉一劑。水二盞。煎一盞。熱服。

小半夏茯苓湯 方見欬逆 理中湯 方見中寒

胃熱

胃中有熱。而作惡心嘔酸。內有熱。脉必浮大而滑。數。煩渴。二陳加薑炒黃連山梔。胃氣不足。內熱惡心。六君子湯加辰砂 炒黃連

二陳湯 方見痰症 六君子湯 方見脾胃

【歌】要識吞酸與吐酸。總因溼熱肺脾間。吐酸吐出酸

吞酸症九

【歌】要識吞酸與吐酸。總因溼熱肺脾間。吐酸吐出酸如醋。若是吞酸咯吐難。

【論】夫吞酸與吐酸不同。吐酸者。吐出酸水如醋。平時津液。隨上升之氣。鬱滯日久。溼中生熱。故從火化。遂作酸味。如穀肉在器。溼熱則易酸。吞酸者。鬱滯日久。不能自涌而出。伏於肺胃之間。咯不得上。嚥不得下。肌表得風寒。則內熱愈鬱。而酸味刺心。肌膚得溫煖。則腠理開發。或得香熱湯丸。則津液流通。鬱熱得行。亦可暫解。蓋標寒而本熱也。故素問

河間言熱者。言其本也。東垣言寒者。言其標也。學者當究其淺深之感。本末之治。而用藥。庶可取十全之效也。

脉　吞酸脉形。多弦而滑。或沉而遲。胸有寒飲。或數而洪。胸有痰熱。

吞酸

吞酸是溼熱鬱滯于肺胃之間。必糲食自養。二陳湯加吳茱萸黃連。順其性而折之。佐以蒼朮茯苓。以行其溼熱。再加薑炒黃連。吞酸有食不化者。平胃散加神麴麥芽山查薑炒黃連。

二陳湯 方見痰飲

平胃散 方見中溼

吐酸

吐酸者。津液隨上升之氣。鬱之日久。溼中生熱。故從火化而作酸味。二陳湯加吳茱萸炒黃連山梔蒼朮厚朴生薑。中脘有宿食留飲。酸味刺心痛。或吐酸水如醋之味。蜇牙痛。麴朮丸。茱連丸。

麴朮丸　治中脘停食留飲。酸蜇心痛。或口吐清水

神麴炒三兩　陳皮一兩　蒼朮米泔浸炒一兩五錢

右為末。生薑汁煮神麴為丸。每服七十丸。薑湯下。

茱連丸

黃連一兩酒炒　黃芩五錢酒炒　陳皮五錢　吳茱萸五錢煮晒乾

蒼朮七錢米泔浸炒

右為末。煮神麯為丸下七十丸。○按是方以芩連治熱。熱去則不吐酸。蒼朮燥溼。溼除則不生熱。陳皮理氣。氣行則溼不鬱。茱萸味辛熱。能引芩連入肝而瀉火。此從治之義也。

嘈雜症十

【歌】痰因火動令人嘈。溼痰氣鬱總同條。肥人白是溼痰故。伐火芩連梔子調。

【論】丹溪云。嘈雜者。俗謂之心嘈是也。有痰因火動者。

作熱者。脉數而大。當治其火而開導次之。有因溼痰者。脉沉而滑。宜豁痰。有因氣鬱者。脉沉而澀。宜開鬱理氣。蓋沉則爲鬱。滑主痰。而澀主氣也。醫能審脉驗症。眞知是火是氣是鬱。斯爲活法矣。

痰

痰因火動者。治痰爲先。二陳湯加薑炒黃芩黃連。山梔子爲君。南星半夏爲佐。桔梗青黛爲使。

二陳湯 方見痰症

氣鬱

氣鬱者。越鞠丸。或二陳湯加枳殼桔梗香附烏藥薑炒黃連蒼朮。有痰加貝母。

越鞠丸 方見鬱症

火

火嘈者。二陳湯加黃芩黃連山梔子。或三補丸。有火鬱。二陳湯加山梔子香附撫芎蒼朮

三補丸

黃芩四兩 黃連四兩 黃蘗四兩

右為細末。水丸。每服七十丸。白湯送下。

食鬱有熱先治火芩連枳朮丸加神麴麥芽山查

陳皮半夏或食鬱不消胸滿嘈雜大安丸

芩連枳朮丸　即枳朮丸加芩連　方見脾胃

大安丸　即保和丸加白朮　方見傷食

欬逆症十一

【歌】陰火攻衝成欬逆或因痰氣滯胸膈胃中積熱與停寒病後胃虛多吃忒

【論】欬逆者古名噦今名呃又名吃忒胃寒者脈遲澀手足寒嘔吐無熱症胃熱者脈洪大燥渴便難有胃中有痰陰虛火炎上衝而呃者其氣從臍下逆

上。丹溪云。上升之氣。至肝而出。中挾相火。經云。諸逆衝上。皆屬于火。有痰氣逆滯者。其氣從胸中起中州元氣鬱也。有病後發呃者。久病胃虛也。宜細辨之。

【脉】呃逆甚危。浮緩乃宜。弦急必死。結代促微

胃火

胃火上逆而呃。小半夏茯苓湯。加山梔黃芩吐之。

利後胃熱而呃。橘皮竹茹湯。

小半夏茯苓湯

半夏五錢湯泡　茯苓三錢去皮

橘皮竹茹湯　治吐利後，胃虛膈熱而咳逆者。

橘皮二錢　竹茹一錢　人參五分　甘草炙五分

右生薑五片，大棗一枚，煎服。

陰火

陰火上逆，從臍下逆上，夜分轉甚者。四物湯加知母、黃蘗、竹茹、陳皮、茯苓。

四物湯　方見血病

病後呃

病後元氣不足，胃虛寒而呃。人參理中湯。痢後發

呃。多不救。用六君子湯。猶或可生。

人參理中湯　方見中寒

六君子湯　方見脾胃

胃寒

胃寒氣逆呃者。丁香柿蒂湯。吐利後胃虛寒。手足厥冷呃逆者。理中湯加丁香木香枳殼。

丁香柿蒂湯

丁香 一錢　柿蒂 一錢　陳皮 一錢　青皮 一錢

人參 五分

右剉一劑。水二鍾。煎八分。溫服。

理中湯 方見中寒

痰氣

無別症。忽然發呃。痰氣逆滯。氣從胸中起。小半夏茯苓湯。加木香枳殼。或蘿蔔湯調木香調氣散。痰礙氣逆而呃。用齏湯探吐。

小半夏茯苓湯 方見前

木香調氣散

木香三兩 檀香三兩 白豆蔻三兩 丁香三兩

砂仁四兩 甘草炙一兩半 藿香一兩五錢

右爲末。每服一錢。鹽湯下。

噯氣症十二

【歌】何故令人成噯氣。蓋緣痰火乘于胃。治痰星夏共陳皮。治火黃連石膏輩。

【論】噯氣者。胃中有火有痰。有食有氣。南星半夏軟石膏炒黑山梔子香附。或丸或煎服。又云痰條下。食積熱。噫氣吞酸症。火氣冲上。多作噯氣黃芩為君。南星半夏陳皮為佐。熱多再加青黛山梔子瓜蔞仁。或潤下丸。

潤下丸 方見痰症

明醫指掌卷五終

訂補明醫指掌卷之六

頭痛症一　眉稜痛附

【歌】頭痛先須辨厥眞。溼痰風火挾邪侵。氣虛血少兼寒溼。識者尤當審六經。更有眉眶頻作痛。風痰風熱客於稜。

【論】如太陽頭痛者。惡風寒。脉浮緊。痛在巔頂兩額角。少陽頭痛者。往來寒熱。脉弦。痛連耳根。陽明頭痛者。發熱自汗。脉浮長大。痛連目眥頰齒。太陰頭痛者。必有痰。體重。或腹痛。脉沉。頭重。少陰頭痛者。足寒氣逆爲寒厥。脉沉細。厥陰頭痛者。吐痰沫。厥冷。

脉浮緩。痛引目系。此六經頭痛。多挾外邪也。血虛頭痛者。自魚尾上攻頭痛也。氣虛頭痛者。耳鳴九竅不利。腸胃之所生。溼熱頭痛者。心煩重痛。病在膈中。過在手太陽少陰。寒溼頭痛者。氣上而不下。頭痛巔疾。下虛上實。過在手少陰巨陽。甚則入腎。偏頭痛者。頭半寒痛。先取手少陽陽明。後取足少陽陽明。厥頭痛者。所犯大寒。至骨髓。髓以腦為主。腦逆。故頭痛齒亦痛。真頭痛者。痛甚入連于腦。手足寒至節。旦發夕死。夕發旦死也。丹溪云。頭痛多主於痰。甚者火。多有可吐者。有可下者。又有眉眶

痛甚。有眉稜骨痛者。眼不可開。晝靜夜劇。屬痰。凡此之類。種種不同。觀其所挾。究其所因。定其經絡。參以脉理。而施以補瀉。宣通汗利之法。斯無一偏之弊也。

六經痛

太陽。川芎羌活藁本麻黃。少陽。小柴胡湯。陽明。升麻葛根湯。加石膏白芷葱白。太陰。蒼朮半夏南星川芎蔓荆子。少陰。麻黃附子細辛湯。厥陰。吳茱萸湯加柴胡。

小柴胡湯方見瘧疾條下

升麻葛根湯　治陽明經頭痛。

升麻一錢五分　葛根一錢五分　白芍藥一錢　甘草一錢　煎服。

麻黃附子細辛湯　治少陰頭痛。

麻黃去節二錢　細辛二錢　附子煨二錢　水二盞。煎溫服。

吳茱萸湯　治厥陰頭痛。或痰涎厥冷。脉浮而緩。

麻黃去節五分　羌活去芦五分　吳茱萸四分　藁本三分

升麻二分　黃芪三分　黃芩一錢　當歸酒洗一錢

黃蘗炒一錢　川芎藭一錢　蔓荊子三分　細辛三分

柴胡　防風　黃芩酒炒三分　半夏泡三分　紅花三分

蒼朮晒乾炒一錢 剉一劑水二盞煎八分服

虛痛

血虛痛。芎歸湯。或四物加酒芩羌活。柴胡蔓荊子。

氣虛痛。四君子湯。氣血兩虛。調中益氣湯。加川芎蔓荊子細辛。巔頂痛。必用藁本柴胡防風。

芎歸湯 治血虛頭痛。一名芎藭湯

川芎藭三錢 當歸酒浸二錢 水二盞。煎八分。食遠熱服。

四物湯 方見血症條下

四君子湯 方見脾胃條下

調中益氣湯 方見內傷條下

風溼寒熱痛

風熱與溼上壅。清空膏。風熱盛者。徹清膏。瘦人頭痛是火。酒芩為主。加引上藥。風熱上攻頭痛者。防風通聖散。或芎芷散。大寒犯腦。令人頭痛。齒亦痛。羌活黑附湯。風熱盛。酒芩天麻川芎防風薄荷。或茶調散。

清空膏 治偏正頭疼。及風溼熱上壅作痛。

細挺子黃芩 三兩一半酒蒸一半炒 防風 去芦一兩

羌活 一兩去芦 甘艸 炙一兩五錢 末之。每二錢。湯調膏下。

徹清膏 治風熱上攻頭痛。

甘艸 生用五分炙用五分 藁本 一錢 末之。茶調下。

蔓荊子一錢 細辛一錢 薄荷三分 川芎藭三分

甘艸生用五分炙用五分 藁本一錢 末之。茶調下三錢

防風通聖散方見中風條下

芎芷散 治風邪入于頭腦作疼痛。

白芷一錢 石菖蒲一錢 陳皮八分 蒼朮米泔浸晒乾炒八分

細辛八分 厚朴薑炒七分 半夏湯泡七分 紫蘇莖葉八分

甘艸炙六分 木通八分 肉桂六分 川芎藭一錢

右剉一劑。水二鍾。加薑三片。葱白二枚。煎八分。服。

羌活黑附湯 治冬月大寒犯腦。令人頭痛齒亦痛。

麻黃帶節三分 殭蠶炒三分 黃蘗炒三分 黑附子泡三分

羌活去芦五分　防風去芦五分　白芷五分　蒼朮米泔浸晒乾炒五分

升麻二分　甘草二分　黃芪一錢　水煎。食後溫服。

茶調散　治諸風上攻頭痛。目昏鼻塞。及偏頭疼。

薄荷葉二兩　川芎藭一兩　羌活去芦五錢　甘艸炙五錢

荊芥穗一兩　白芷五錢　細辛一錢五分　防風三錢去芦

右為細末。每服二錢。食後茶湯調下。

痰痛

痰厥頭痛。四陳湯加蒼朮蔓荊子南星防風。肥人頭痛是溼痰。半夏蒼朮為主。加引經嚮導藥。痰厥頭痛。痰唾稠粘。頭旋眼黑。宜芎辛加減湯。[illegible]

星半夏細辛。或青州白丸子。風痰上盛。三生散。

朮天麻湯。風痰上攻頭痛。白芷芎茶川芎防風散

星半夏細辛。或青州白丸子。風痰上盛。三生散。

二陳湯 方見痰症條

半夏白朮天麻湯 治眼黑頭旋。頭苦疼痛吐逆。

白朮炒一錢 神麯炒一錢 陳皮一錢五分 半夏湯泡一錢五分

麥櫱一錢五分 白茯苓五分 天麻五分 黃芪五分蜜炙

人參去芦五分 蒼朮泔製五分 澤瀉五分去毛 乾薑三分

黃蘗酒炒三分 剉一劑。水二鍾。煎至八分。空心熱服

青州白丸子 治風痰壅盛。癱瘓驚風嘔痰水涎沫。

白附子二兩 半夏二兩 南星二兩 川烏去皮臍半兩俱生用

右搗為末。以生絹袋盛之。于井花水中擺出藥末。更以手捏令出。以粗查再搗。仍入絹袋擺盡為度。貯磁器中日曬夜露。每日一換新水。攪而復澄。春五日。夏三日。秋七日。冬十日。去水曬乾再研。以糯米粉清丸如菉豆大。常服二十丸。生薑泡湯送下。

三生散　治風上攻頭腦痰滯不行。以致偏正苦疼。

烏頭炮一錢　白附炮二錢　南星炮二錢半　薑三片。水煎服。

眉眶痛

肝虛羞明眉眶痛者。熟地黃丸。風熱燥眉眶痛。選奇羌防散。或苓芷散。風痰攻上眉稜痛者。導痰湯。

肝虛羞明眉眶痛者熟地黃丸。風熱盛眉眶痛……

寒溼上攻眉稜痛者芎辛散。風痰風熱盛二烏散。

熟地黃丸　治肝血虛少，眉眶疼痛，羞明畏日之症。

生地黃一兩　熟地黃一兩　玄參一兩　金釵石斛一兩

右末之，蜜丸梧桐子大，每服三錢，空心白湯送下。

選奇羌防散　治風熱上壅，眉稜疼痛不可忍之症

羌活二錢，去芦　防風二錢，去芦　甘艸二錢　黃芩二錢，酒炒　煎服。

芩芷散　治風熱上盛，眉眶疼痛，目不能視物者。

黃芩一兩，酒炒　白芷一兩　末之，每服二錢，茶清調下。

導痰湯　方見痰症條

芎辛散　治頭疼，因寒溼上攻，或眉稜作痛，並治之。

烏頭生用一兩 附子生用一兩 天南星一兩 乾薑一兩
甘艸炙五錢 川芎一兩五錢 細辛一兩五錢 每四錢。薑棗煎。

二烏散 治風治熱。二氣攻於太陽等經。頭腦作痛。
川烏童便浸炒五錢 艸烏童便浸炒五錢
細辛五錢 羌活去芦五錢 黃芩酒炒五錢 甘艸炙三錢
右末之。每服二錢。食後茶清調下。

頭風症二一

〔歌〕頭風素有熱和痰。忽冒風寒腦髓間。何故女人多病此。爲無巾幘禦風寒。

〔論〕夫頭風。即首風也。孫思邈云。新沐浴竟取風。爲首

病甚。頭痛不可以出內。至其風日則病稍愈。又云

風經云首風之狀頭面多汗惡寒當先風一日則病甚頭痛不可以出內至其風日則病稍愈又云頭風者本于風寒入于腦髓也蓋頭者爲諸陽之會其人素有痰火風寒客之則熱鬱而悶痛故婦人多患此者無巾幘以禦風寒故也有偏有正丹溪云頭風屬痰者多有熱有風有血虛在左屬風與血虛在右屬痰與熱善治者究此病情全在活法出入加減無不奏效也

風與血虛

頭風在左屬風與血虛風者荊芥薄荷之類風熱

者。消風散。茶調散。血虛者。芎歸湯。或四物湯。加荆芥防風白芷酒芩薄荷蔓荆子之類已上諸方俱見頭痛症下。

痰

頭風在右者屬痰。蒼朮半夏之類。濕痰頭風。用酒芩三錢。蒼朮四錢。川芎細辛各二錢。甘艸一錢。末之。薑茶擂勻調服。或二陳湯。加炒薄荷。川芎細辛。或導痰湯加酒芩蒼朮。已上二方。俱見痰症

火

頭風屬火者。酒芩為主。或二陳湯酒芩薄荷川芎細辛。方見痰症或防風通散方見頭痛症或消風百解散。

消風百解散　治半邊頭風作痛因火熱上沖之症。

消風百解散 治半邊頭風作痛。因火熱上沖之症。

荊芥一錢 白芷一錢 陳皮八分 麻黃一錢

蒼朮一錢米泔水浸冬七日夏三日春秋五日曬乾炒 甘艸八分

右剉一劑。水二盞。煎八分。食遠服。

附方 治偏頭疼至妙之藥。

羌活去芦一錢 獨活去芦一錢 川芎一錢 白芷一錢

細辛一錢 藁本去芦一錢 防風去芦一錢 黃芩酒炒一錢

右剉一劑。水二盞。煎八分。食後熱服。

又方 治半邊頭痛極效。

香白芷一錢　天南星一錢　川烏八分　半夏八分

右爲末。每服一錢。水調服。婦人加甘艸一錢

頭眩症三

歌　痰火令人頭轉旋。氣虛血失每頭眩。風寒暑溼乘虛致。識得其機可望痊。

論　眩者。目花黑暗旋倒也。其狀頭眩目閉。身轉耳聾如立舟車之上。起則欲倒。虛極乘寒得之。故風則有汗。寒則掣痛。暑則燠悶。溼則重滯。此四氣乘虛而眩暈也。或七情鬱而生痰動火。隨氣上厥。此七情致虛而眩暈也。酒色過度。腎虛不能納氣歸元。

逆奔而上。氣虛而眩暈也。或血虛崩漏。或產後

脾虛不能收攝營氣。使諸血失道妄行。此血

也。丹溪云。頭眩多挾痰氣。虛併火。及溼痰

無痰不能作眩。痰因火動也。凡此之症。要

在治之。隨機應變。不可以一途而取轍也。

曰。諸風掉眩。皆屬肝木。肝木爲風所撼。必

以金不能制木。風捲痰而上升。故目無

甚則嘔吐。飲食罕御。大法平其風。

或因崩淋頭眩。以血虛治。爲少血

依虛不能不動搖。故眩。治崩淋。則

九

也。

下虛上實。皆頭眩暈。風浮寒

人。緊芤而澀數大火邪。虛大

五

方鼻頭風寒上厥眩暈。芎

偏痛症

湯一兒痰症加人參白朮山

丸腰

下。

術

桂二錢

水二盞煎一盞服

半夏白朮天麻湯。

[illegible]四君子湯。方見四君加

[illegible]芎歸湯。方見頭痛失血眩暈。四物

[illegible]芷散暈清風散。方見女科

一、[illegible]治[illegible]虛者。加芎歸。肉桂、

[illegible]半夏麴一錢 橘皮一錢

[illegible]香炒十四 甘草炙八分

二盞。煎一盞。食遠熱服。

[illegible]麴酒芩白朮南星天麻蒼朮。方見
[illegible]見半夏白朮天麻湯。方見頭痛
者二陳湯加黃芩黃連蒼朮羌活。方見痰症
炒大黃末茶調下。
酒浸九蒸九晒為末。水丸如菉豆大。每
食後臨臥清茶送下。神效。
夏白茯苓。川芎。甘草。羌活。白芷。枳實。南星
辛酒黃芩。氣虛加參朮。血虛加芎歸熟地
等分。每服三五錢。水煎服。以此作丸。每用下二

三一極効

心痛症四

心痛當分久與新。暴嬰寒氣必須溫。若還稍久多成鬱。鬱積因而作熱蒸。大實痛時難以按。按之痛定作虛論。蚘蟲痛止偏能食。脉澀須知死血因。眞痛在心無藥療。厥疼胃脘正當心。

論 夫心痛者。有眞有厥。眞者。邪中心君。手足青至節。即死非藥可療。厥者。邪客于心胞絡胃脘之間。當心之分。非眞心受症。故可治也。又有寒厥熱厥之分。大實大虛之別。古人又有九種之名。曰飲。曰食

曰風。曰冷。曰熱。曰悸。曰蟲。曰疰。曰去來痛。若此者。皆可究其因而施治也。其如陳無擇云。有五臟及諸經諸府心痛。雖言之詳。而無治例。反使後學有惑于心。故不具載。蓋亦不過寒熱表裏虛實之候也。丹溪云。心脾痛。須分新久。若明知身受寒氣。口食寒物。於初病之時。當以溫散溫利之劑。若得稍久而成鬱。鬱則蒸熱。熱久必生火。若欲行溫劑。寧無助火添病乎。故古方多以山梔為熱藥嚮導。則邪易伏。病易退。又審平昔喜食熱物。以致死血留于胃脘。或因痰氣食積鬱滯。下胃作痛者如此其

○謹按世人患真心痛者極少。真心痛者。平素原有

○謹按世人患眞心痛者極少眞心痛者平素原有痰卒然大痛如割入手無聲汗出不休舌强無言手足厥冷此疾一作死在旦夕鍼灸之所不施藥力之所未及患之者十無一生蓋眞邪直中心經君火不能抗敵故也今之患心痛者乃胃脘與心胞絡痛耳若痛極如咬時吐清水面清白少光彩者爲蟲頭上攻痛時如有物阻礙纍纍不得下爲胃脘停食痛時嘈雜不寧如飢如飽怏怏欲吐吐即稍寬爲痰飲停積痛時隱隱悶結胸臆相引得

噯覺寬爲憂鬱所致痛時欲近煖處飲熱酒即解爲寒客心胞絡痛時自上而下自聞唧唧有聲搔抓無措眠坐不穩心下如刮上連胸臆乃積血不消爲火所載不可認以爲蟲而投以蟲劑也

【脈】心痛微急痛甚伏入陽微陰弦或短又數緊實便難滑實痰積心痛引背脈微而大寸沉而遲關緊數銳

虛痛

虛弱人心痛錢氏云心虛痛者炒鹽補之以物按住而痛止者挾虛也二陳湯加炮薑末和之方見痰症

子湯加砂仁香附方見脾胃

若久病元氣虛弱肢體怯薄脈虛手欲按者六君子湯。加砂仁香附（方見脾胃）

實痛

因氣怒而飲食。卒痛便閉。心胸高起。手不可按者。大實痛也。煮黃丸。後以藁本湯去其餘邪。胃脘溼熱痛。小胃丹（方見痰症）

煮黃丸（治大實心痛） 雄黃（一兩研） 巴豆（五錢去皮細研） 入白麪二兩研勻水丸梧子大。每用水下數丸。如得利。不可再服。宜服藁本湯以去餘邪。

藁本湯（治心痛後服） 藁本（半兩） 蒼朮（一兩米泔浸炒） 作一貼煎服

熱厥心痛

熱厥心痛者。其人必縱酒蓄熱在胃。偶遇寒鬱而發故身熱足冷。痛甚則煩躁而吐。額上有汗。脉洪大當灸太谿崑崙。表裏俱瀉之。內服金鈴子散。痛止服枳朮丸以去餘邪。方見脾胃 初痛以鹽湯探吐。得吐就發散。心脾痛日久。則非寒也。縱有寒。亦鬱而爲熱。二陳湯。加山梔炒黑。川芎香附。痛甚者。加炮薑反佐之。方見痰症 或以山梔一味。入薑汁煎服。大便不通。大承氣大陷胸之類下之。方俱見傷食

金鈴子散　金鈴子一兩　玄胡索一兩　末二錢。溫酒下。

寒厥心痛

寒厥心痛者。手足厥逆。徧身冷汗。甚則手足甲青黑。小便清白不渴。氣微力薄。脉沉細微。朮附湯。大寒厥暴痛。非久痛者。若久則非寒也。丹溪云。明知身受寒氣。口食寒物。初病當以溫散溫利之藥。艸豆蔻丸。大便閟結不通者。元戎厚朴丸

朮附湯 治寒厥心痛
白朮二錢炒 甘艸一錢炙 黑附子炮一錢半
右三味。剉作一貼。薑三片。棗二枚。水二鍾。煎溫服

艸豆蔻丸 治寒厥心痛
艸豆蔻一錢五分白麪裹煨 益智仁八分
陳皮八分 人參去芦八分 黃芪蜜炙八分 吳茱萸洗去芦八分

殭蠶八分　當歸酒洗六分　青皮炒六分　神麯炒四分
薑黃四分　柴胡四分　半夏薑製一錢　澤瀉去毛一錢
桃仁七箇泡去皮尖　麥芽炒一錢　甘草生三分炙三分
右為細末。湯浸蒸餅。丸如梧桐子大。每三十丸。

元戎厚朴丸
厚朴三兩薑炒　黃連二兩半炒　吳茱萸湯泡七次一兩
乾薑炮二兩　巴豆一兩另研　人參一兩去芦　川烏炮一兩
末之。入豆霜匀。蜜和丸桐子大。每三丸。以利為度。

痰積食積心痛

痰飲積滯于胃脘。當心而痛。牆上陳螺螄殼煅存性。炒蒼朮海石山梔香附南星各二兩。枳殼青皮

木香半夏砂仁各半兩糊丸薑湯送下食積痛保和丸。方見傷食

瘀血痛

平昔喜食熱物。致死血畱于胃口作痛者。脉沉而芤澀。在上者。四物湯加桃仁紅花丹皮枳殻玄胡索。方見血症輕者。韭汁桔梗開之。重者桃仁承氣湯下之。方見血症

蟲痛疰痛

蚘蟲攻入心膈作痛者。痛定便能食。面上有白斑唇紅。治以苦楝錫灰或烏梅丸或集効丸。蚘蟲攻

嘈心痛。惡心而吐。川椒湯下烏梅丸。痓心痛者。十痓病皆心痛。化蟲丸。辣蓼草煎湯飲之。

烏梅丸 治蚘蟲上攻痛

烏梅七十五箇 細辛一兩 附子炮一兩五錢

人參一兩五錢 黃栢一兩五錢 桂枝一兩五錢 乾薑二兩五錢

黃連四兩 川椒五錢 當歸五錢

末之以苦酒漬烏梅一宿。去核蒸爛。搗成膏。少加蜜和丸如梧桐子大。每十丸。加至二十丸。食前服。

集効丸 治蚘厥心痛

木香二錢五分 鶴虱炒二錢半 檳榔二錢五分

訶子二錢五分 蕪荑炒一錢半 附子炮二錢半 乾薑炮二錢五分

大黃蒸熟一兩半 烏梅肉焙爛一兩

湯送下。

化蟲丸 服之蟲化為水 胡粉炒五錢 鶴虱二錢 白礬五錢

檳榔五錢 苦楝根五錢

右為細末糊丸梧子大每服五十丸溫漿水入芝蔴油一二點打勻下之米飲亦可不拘時候其蟲小者化為水大者自下。

腹痛症五

歌 寒痛綿綿無減增時疼時止熱為根血瘀痛處無移動食積便逼便見輕實者不能將手近痛時能

按作虛論溼痰痛者溲便秘體認其形見病情。

論　夫寒痛者。常痛而無增減也。成無巳云。陰寒爲邪。則腹痛而吐利。熱痛者。時作時止。原病式云。熱鬱于內。而腹滿堅結痛。勿以爲寒。死血痛者。每痛不移其處。成無巳云。邪氣聚于下焦。津液不得通。氣血不得行。或溺或血留滯于下。是生脹鞕。小便不利也。食積痛者。利後即痛減。溼痰痛者。凡痛大小便俱不利。丹溪云。清痰多作腹痛。脉滑。痰因氣滯而聚。凝其道路不得通。故也。腸癰痛者。身甲錯。小便如淋。腹皮急。按之濡。如腫狀。脉芤數也。積聚腹

痛者。腹中原有積。左右上下。當積而痛也。寒疝入
腹痛者。少腹痛引睪丸。陰毒痛者。四肢厥逆。痛甚。
咽喉不利。或心下脹滿結燥。虛汗狂言。面色俱青。
陰積于下。陽消于上。實痛者。腹堅不可按。虛痛者。
雖痛不脹滿。手可按。若此胥壞不俟。可一藥而盡
之乎。
○謹按腹痛。爲脾家受病。蓋脾或受有形而痛者。或
受無形而痛者。若暴傷飲食。則胃脘先痛而後入
腹。暴觸怒氣。則兩脇先痛而後入腹。血積上焦。脾
火薰蒸。則痛從腹而上于胸臆。血積下部。胃氣下

行則痛從腹而入于少腹傷于寒者寒於痛得熱則緩傷于飢者飢即痛得食即止吞酸腹痛爲痰鬱中焦復傷飲食面黃腹痛爲宿食不消蚘蟲攻咬氣虛腹痛腹必虛豁呼吸短淺血虛腹痛者痛如芒刺牽引不寧醫者當審其因以處治大要以甘溫爲上惟傷酒作痛者方可涼劑而必佐之以甘溫也

【脉】沉弦細動皆是痛症心痛在寸腹痛在關下部在尺脉象顯然

熱痛

胸中有熱，胃中有邪，腹痛欲嘔，黃連湯。腹痛脈洪熱也，黃芩芍藥湯。寒邪變熱傳裏，腹痛便秘而厥。四逆散。腹滿時痛，桂枝加大黃湯。腹痛便秘脈實大者，大承氣湯。方見傷食

黃連湯 治熱邪腹痛

黃連 炒三錢　甘草 炙三錢　乾薑 三錢　桂枝 三錢　人參 二錢　半夏 半兩薑製

每七錢，棗煎服。

黃芩芍藥湯

黃芩 炒二錢　芍藥 炒一錢半　甘草 一錢

煎服。

四逆散 陽邪傳裏腹痛

甘草 炙一兩　枳殼 炒一兩　芍藥 炒一兩　柴胡 一兩

末之，每服二錢，白湯調下。

桂枝加大黃湯 治太陰腹滿時痛

桂枝 一錢　芍藥 炒一錢

甘草一錢大黃二錢薑棗煎。入餳一合。微烊服。

寒痛

傷寒下利腹痛。四逆湯。方見中寒腹痛厥冷欲死者。霹靂散腹痛下利四肢沉重。眞武湯。或理中湯方見中寒

霹靂散治中寒腹痛 附子炮一枚入眞臘茶一大盞。同研勻。更分二劑。水二鍾。煎八分。入熟白蜜一匙。涼服。

眞武湯治少陰腹痛 茯苓一錢五分 芍藥炒一錢半 生薑七片 附子炮二錢 水二大盞。煎至一盞。冷服。

痰痛食積痛

青痰多作腹痛。台芎蒼朮木香白芷香附末之。薑

芍藥之類。飲食過傷腹痛，保和丸。木香檳榔丸。二方俱見傷食

虛人飲食傷腹時痛，六君子湯加麴蘗。方見脾胃

虛痛

素弱人全不思食，腹冷痛，養胃湯加肉桂、茱萸、木香。或小建中湯。方俱見脾胃 或理中湯。方見中寒 腹痛欲以手按，按之痛止者屬虛，參、朮、薑、桂之類。血虛腹痛。須用白芍藥之酸補以和之，或四物湯加蕉炒乾薑，炒芍藥倍用。方見血症

實痛

凡痛脹滿。手不可按。大實也。大承氣湯。方見傷食初得腹痛。元氣未虛。宜推蕩之。此通因通用。痛隨利減也。桂枝加大黃湯、方見前熱腹痛條下或木香檳榔丸。方見傷食

血痛

因跌撲瘀血。腹痛脈芤。桃仁承氣湯。加蘇木紅花。方見血瘕女人經閉血積滯。腹中痛。玉燭散。即大承氣湯對四物湯。二方。一見傷食。一見血瘕。或失笑散方見女科惡露條下或通經散。

通經散活血定痛　陳皮一兩　甘遂一兩煨　當歸尾一兩五錢

川芎一兩　紅花一兩酒洗　桃仁一百個去皮尖

右剉。每服七錢。水二鍾。酒一鍾。煎至八分。空心服。

腹中上下左右有積聚。當積而痛。三聖膏。或木香

積聚痛

腹中上下左右有積聚。當積而痛。三聖膏。或木香檳榔丸。保和丸。二方俱見傷食 丁香脾積丸。食積痞塊作痛。阿魏丸。

三聖膏 未化石灰半斤為細末。瓦器中炒。令淡紅色。提出火。候熱稍減。次下大黃末一兩。徹炒。又提出。候溫。下桂心末半兩。略炒。入陳米醋熬。攪成黑膏。厚紙攤貼患處。其痛自減。塊漸消矣。

丁香脾積丸 丁香半兩 木香半兩 巴豆去心膜油半兩

良薑醋煎半兩 蓬莪朮三兩 京三稜三兩 皂莢三條去皮弦子

青皮一兩 末之。入百草霜三錢糊丸麻子大。每服十丸空心時。白沸湯下。

阿魏丸 治肉積腹痛 連麴半兩去殼 山查一兩去核 阿魏一兩 黃連六錢 末之。用阿魏醋煮作糊。丸如梧桐子大。每服五六十丸。清晨白滾湯送下。

腸癰痛

腸癰痛者。腹大痛。身甲錯。小便如淋。脈芤或數。有瘡。積冷。以附子溫之。積熱。以大黃下之。膿大出。以參芪補之。

陰毒痛

陰毒厥逆腹痛。陰寒欲絕。脈沉。爪甲手指唇面青黑者。回陽丹。或眞武湯。方見寒腹痛 急灸關元氣海。各五七十壯。

回陽丹 陰毒厥冷腹痛

牡礪燒一錢 良薑炒一錢 不灰木燒一錢 川烏泡一錢 白芍藥一錢 麝香少許

末之。每用一錢男用女津調塗外腎。女用男津調塗兩乳。

痧症痛 附疝痛

忽然腹中大痛。嘔吐脈沉。痧症也。正氣散加香附砂仁。方見霍亂 手足厥冷。舉體轉筋。理中湯。方見中寒 少腹引睾丸痛。疝氣入腹中痛。脈沉弦。補腎湯。餘詳疝

症本條

補腎湯　治疝氣入腹痛

人參去芦一錢　白茯苓一錢　黄芪蜜炙一錢

附子炮一錢半　白朮炒一錢　沉香一錢二分　木瓜一錢二分

羌活去芦八分　川芎七分　紫蘇八分　甘草炙六分

右剉一劑。薑三片。棗二枚。水二盞。煎八分。空心服。

脇痛症六

〔歌〕脇肋疼時統屬肝。或虚或實或因痰。脉沉氣鬱須開導。芤澀原來死血干。食積一條常梗起。肝虚痛在脇梢間。若然痛甚肝經火。乾脇之疼療最難

〔論〕足厥陰之絡。令人脇痛。皆肝膽經之所主也。丹溪

云木氣實肝火盛死血痰飲氣滯食積濕熱皆令
人脇痛亦有肝虛血少而痛者有因酒色勞損太
過脇下一點痛不止名乾脇痛甚危當大補氣血
尚難爲也若此虛實之不同也必以脉症參之斯
得其受感之情而用藥無差忒也

○謹按左脇痛者肝經受邪也右脇痛者肝邪入肺
也左右脇俱痛者肝火盛而木氣實也兩脇走注
痛而有聲者痰飲也左脇下有塊作痛不移者死
血也右脇下有塊作痛飽悶者食積也咳嗽氣急
發熱者痰結痛也久而不治則成肺癰勞傷身熱

脇痛者。脉必虛也。宜詳究之

脉　兩脇疼痛。脉必雙弦。緊細弦者。多怒氣偏。沉澀而急。痰瘀之徵。

肝火盛

脇痛甚者。肝火太旺也。當歸龍會丸。輕者小柴胡湯加黃連龍膽艸白芍藥醋炒青皮。方見瘧疾

火盛者宜伐火。左金丸

當歸龍會丸

膽艸去芦一兩　當歸酒洗一兩　山梔子仁炒黑一兩

黃連炒一兩　黃芩炒一兩　黃蘗炒一兩　大黃半兩

蘆薈半兩　木香一錢半　麝香半錢　爲丸。淡薑湯下。

左金丸（治肝火太盛）黃連（六兩）吳茱萸（一兩湯泡）為丸白湯下。

木氣實

脇痛脉弦數。木氣實也。醋炒青皮。蒼朮川芎當歸芍藥柴胡。或小柴胡湯。加醋炒青皮川芎膽艸。方見瘧疾或抑青丸

抑青丸（治肝火伐肝木）黃連（不拘多少薑汁炒）為丸。每百丸。白湯下。

死血痛

脇痛日輕夜重或午後發熱。脉芤而澀。瘀血也。四物湯。加柴胡青皮桃仁紅花。行氣藥中加破血藥。

食積痛

脇下一條扛起作痛者。食積也。保和丸。方見傷食 或吳茱萸炒黃連。神麴麥芽山查蓬朮青皮。或當歸龍薈丸。方見前肝火盛條下

濕熱

濕熱盛而兩脇痛者。先以琥珀膏貼痛處。後以淡薑湯吞當歸龍薈丸。方見前肝火條下 或小柴胡湯。加蒼朮青皮黃連。方見瘧疾

痰積

痰積脇下作痛。控涎丹。或十棗湯。或二陳湯。加南星蒼朮川芎柴胡白芥子炒山梔仁醋炒青皮。方見

條內

控涎丹 治兩脇痰痛 乾遂 麪裹煨 大戟 製 白芥子 炒各等分

右末。丸如梧子大。每五七丸。漸加至十丸。薑湯下。

十棗湯 治痰積脇痛 甘遂 麪裹煨一錢 大戟 製一錢

芫花 一錢 棗子十枚。水二盞。煎八分服

氣滯

氣滯脇下作痛。推氣散。或復元通氣散。控涎丹。方見前痰積脇痛條下 治一身氣痛。氣鬱者。詳鬱症條內。

推氣散 治右脇疼痛 枳殼 炒五錢 桂心 五錢 片子薑黃 五錢

甘艸 五錢 末之。每服二錢。薑棗湯調下。

復元通氣散 木香半兩 茴香半兩 青皮半兩

穿山甲炮七大片 陳皮半兩 白芷半兩

甘草半兩 每服五錢。水二鍾。煎八分。空心服。或作末。每服二錢空心酒調下。

虛痛

肝血不足。悠悠痛不止者。四物湯加柴胡梢。方見血症

若脇下一點痛不止。此因酒色太過所致。名乾脇痛。難治。肥白人脇痛。參芪入小柴胡湯服。方見瘧疾

枳芎散 附方治左脇痛 枳實炒五錢 川芎五錢 粉草炙一錢半

剉末。每服二錢。薑棗湯。或酒調下。